



The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device accompanied by laser therapy in the rehabilitation of the injured elbow joint in women

Dr. Anas Saadoon Hussein*¹ 

¹ Middle Technical University / College of Electrical Engineering, Iraq.

*Corresponding author: Anaas.saadoon@mtu.edu.iq

Received: 11-05-2024

Publication: 16-08-2024

Abstract

The importance of the research comes from reducing the duration of treatment as well as the importance of modern devices used in the research, whether in treatment or in exercises. The researcher used laser in treatment, which is the latest method in the world, which ensures the treatment of the injury and the return of the injured person to practice her daily work at a record speed. The Marcy wedge device was also used to perform strength and flexibility exercises at a slow pace. The researchers also used the 200-EK3 electronic device to measure muscle strength in Newton units. The problem of the research lies in the long duration of the treatment programs used in medical rehabilitation centers, which are not in the interest of the injured person. Therefore, the researcher decided to reduce the duration of treatment by using modern and advanced devices that save time and effort. The study aimed to prepare strength and flexibility exercises using the Marcy wedge device and laser therapy sessions in the rehabilitation of the injured elbow joint in women, and also to identify the effect of strength and flexibility exercises accompanying the laser therapy sessions prepared in the rehabilitation of the injured elbow joint in women.

The researcher used the experimental method with a single-group design and a pre- and post-measurement method. The research was conducted on a sample of (20 injured) who were deliberately selected from among women with tennis elbow injuries, aged between 25-30 years. . The researcher concluded that the therapeutic laser has a positive effect in reducing pain and speeding up the healing of the injury, and that the treatment program using the Marcy wedge device led to an increase in the strength and flexibility of the injured elbow joint. The researcher recommended the necessity of adopting laser in the treatment of various injuries because it achieves good results in a short time.

Keywords: Rehabilitation program, Marcy wedge device, laser

<https://doi.org/10.33170/jocope.v17i3.313-335>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

تأثير برنامج علاجي باستخدام جهاز مارسي الوند المصاحبة للعلاج بالليزر في تأهيل مفصل
المرفق المصاب عند النساء

د. اناس سعدون حسين

الجامعة التقنية الوسطى / كلية هندسية كهربائية

Anaas.saadoon@mtu.edu.iq

تاريخ نشر البحث 2024/8/16

تاريخ استلام البحث 2024/5/11

الملخص

تأتي أهمية البحث من تقليل مدة العلاج وكذلك من أهمية الاجهزة الحديثة المستخدمة في البحث سواء في العلاج او في التمرينات، إذ استخدم الباحث الليزر في العلاج وهو احدث وسيلة على مستوى العالم والذي يؤمن علاج الاصابة وعودت المصابة لممارسة اعمالها اليومية بسرعة قياسية، كما تم استخدام جهاز مارسي الوند في اداء تمرينات القوة والمرونة وبأيقاع بطيء. كذلك استخدم الباحث جهاز EK3-200 الالكتروني لقياس القوة العضلية بوحدات النيوتن، اما مشكلة البحث فتكمن في طول مدة البرامج العلاجية المستخدمة في مراكز التأهيل الطبي والتي لا تنصب في مصلحة المصابة، . هدفت الدراسة إلى إعداد تمرينات القوة والمرونة باستخدام جهاز مارسي الوند وجلسات العلاج بالليزر في تأهيل مفصل المرفق المصاب عند النساء.

استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة وبأسلوب القياس القبلي والبعدي وأجري البحث على عينة عددها (20 مصابة) تم اختيارهم بصورة عمدية من بين النساء المصابات بإصابة مرفق التنس وتراوحت اعمارهن بين 25-30 سنة، ، إذ تم عرضهن على طبيب اختصاص ليتم تشخيص الاصابة لديهن وبعد ذلك تم اخضاع العينه لجلسات العلاج بالليزر وتمرينات لزيادة قوة ومرونة مفصل المرفق المصاب. واستنتج الباحث، ان لليزر العلاجي تأثير إيجابي في تخفيف الالم وسرعة شفاء الإصابة، ان البرنامج العلاجي باستخدام جهاز مارسي الوند ادت الى زيادة القوة والمرونة لمفصل المرفق المصاب.

الكلمات المفتاحية : برنامج تاهيلي ، جهاز مارسي الوند ، بالليزر

1- التعريف بالبحث

1-1 المقدمة :

تعد الإصابة أياً كان نوعها من المعوقات التي تمنع المصاب من تأدية المهام الموكلة اليه سواءً كان المصاب رياضي أم غير رياضي، ويتفق جميع العاملين في مجال الطب الرياضي والعلاج والتأهيل على ذلك، فالإصابة ليست حصراً على الرياضيين فقط فهي تحدث لكافة شرائح المجتمع، العمال، الموظفين وربات البيوت، فالإصابة هي نفسها للرياضي وغير الرياضي وطرائق علاجها وتأهيلها واحدة للأثنين، من هنا جاءت فكرة البحث بضرورة الاهتمام بكافة شرائح المجتمع وتقديم العون لهم من خلال البرامج التي نقوم بأعدادها، ومن خلال زيارة الباحث لمراكز العلاج والتأهيل لاحظوا كثرة النساء المصابات بإصابة مفصل المرفق نتيجة الاعمال اليومية التي يقوم بها، وتعد أصابة مفصل المرفق او ما تسمى بمرفق التنس وهي غير مقتصر فقط على لاعبي التنس لكن أطلق عليها مرفق التنس لأنها تعتبر مشكلة ذات أهمية عند لاعبي التنس، ومن الجدير بالذكر ان هناك فئة ليست بالقليلة تصاب بهذه الإصابة وهن ربات البيوت اللواتي يقومن بأعمال منزلية كثيرة ومتعددة مما يؤدي الى حدوث هذه الاصابة، لذلك كان من الضروري البحث المستمر وايجاد الطرائق التي تعالج الاصابة بأسرع وقت ممكن، لقد انتشر في الاونة الاخيرة استعمال العلاج بالليزر على نطاق واسع في العلاج والتأهيل لجميع الاصابات، ومن المتعارف عليه في الاوساط الطبية ان لليزر عدة انواع وقد استخدم الباحث احد الانواع التي تستخدم في العلاج والتأهيل وهو ليزر زرنينخ الغاليوم، كما "أن اشعة الليزر لها القدرة على خفض مستوى الالم وتحسن الكفاءة الوظيفية للعضو المصاب".

(Herman.J.M:and Khosla,R,2007,p505)

اما الوسيلة الثانية المستخدمة في البحث فهي جهاز مارسي الوتد متعدد المقاومات والذي يؤمن للمصاب الراحة التامة عند اداء التمرينات وعدم الشعور بالملل مما يعطي نتائج افضل من الطرائق العادية في اعطاء التمرينات اضافة الى ان استخدام هذا الجهاز يقلل من الوقت والجهد بالنسبة للمصاب، وتأتي الاهمية الانسانية لهذا البحث من أهمية شريحة النساء المصابات وهن ربات البيوت، أما الأهمية العلمية لهذا البحث فيمكن اجمالها في تقليل مدة العلاج وكذلك حداثة الاجهزة المستخدمة، فالليزر المستخدم يعد احدث وسيلة علاج طبيعي على مستوى العالم كما ان هذه الدراسة ما هي الا محاولة ايجابية لتسريع العلاج والعودة الى الوضع الطبيعي قبل حدوث الاصابة وبأسرع وقت وجهد ممكن اضافة الى عدم حصول مضاعفات اخرى . وان طول مدة العلاج والتأهيل لاصابة مفصل المرفق بالنسبة للنساء وغيرهم من المصابين والتي تستخدم فيها تمرينات واجهزة كثيرة وبطريقة عشوائية تعد من اهم المشاكل التي قد تؤثر على سير الحياة

اليومية لهذه الفئات من المجتمع لذلك كان من الضروري البحث المستمر لأيجاد طرائق بديلة وسريعة في العلاج والتركيز على الاجهزة الحديثة التي تعطي نتائج سريعة وأمنة في نفس الوقت من اجل تقليل المدة اللازمة للعلاج ، لذلك ارتأى الباحث استخدام العلاج بالليزر وكذلك جهاز مارسى الوند والتي تعالج وتؤهل الاصابة في نفس الوقت وبأقل وقت وجهد ممكن، وبما أن اغلب البرامج العلاجية تستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد الى شهرين او اكثر من ذلك وهذا لا ينصب في مصلحة ربات البيوت، لذلك كان من الضروري دراسة هذه المشكلة وايجاد الحلول لها من خلال استخدام الطرائق والاجهزة العلاجية الحديثة والسريعة والتي تؤمن شفاء المصابة وعودتها لممارسة اعمالها اليومية بكفاءة خلال ايام وليس اشهر.

ويهدف البحث الى .

- إعداد برنامج تأهيلي باستخدام جهاز مارسى الوند المصاحبة لجلسات العلاج بالليزر لتأهيل مفصل المرفق المصاب عند النساء.

- التعرف على تأثير البرنامج التأهيلي المصاحب لجلسات العلاج بالليزر في تأهيل مفصل المرفق المصاب عند النساء.

2- اجراءات البحث :

1-2 منهج البحث : استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة وبأسلوب القياس القبلي والبعدي وذلك لملائمته وطبيعة مشكلة البحث.

2-2 عينة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من النساء (ربات البيوت) المراجعات في مركز العلاج الطبي والتأهيل /صدر القناة، واللواتي تم فحصهن من قبل احد الاطباء المختصين دكتور عماد خضير/ مركز العلاج والتأهيل الطبي/صدر القناة في المركز، ومن خلال الفحص الطبي والاشعة تم تحديد الاصابة (اصابة مفصل المرفق)، وقد بلغ عدد العينة (20) مصابة، وتراوحت مدة الاصابة بين (1-3) اشهر اما اعمارهن فقد تراوحت بين (25-30) سنة

3-2 تجانس العينة :

جدول (1)

يبين تجانس عينة البحث في متغيرات الطول والوزن والعمر

المتغير	وحدة القياس	الوسط الحسابي	الوسيط	الانحراف المعياري	الالتواء
العمر	سنة	27,050	27	1,669	0,591
الوزن	كغم	69,800	69	3,533	0,963
الطول	سم	160,500	160	2,013	0,903

تم اجراء تجانس للعينة في متغيرات العمر والوزن والطول وقد اوضحت النتائج الأحصائية بأن

العينة متجانسة وكما مین في الجدول (1)

4-2 الوسائل والأدوات والأجهزة المستخدمة :

- 1- المصادر والمراجع العربية والأجنبية.
- 2- استمارة تسجيل معلومات عن المصابات.
- 3- استمارة تسجيل القياسات والاختبارات.
- 4- جهاز مارسي الوند لتدريب القوة العضلية والمرونة ملحق (1) .
- 5- جهاز الجانوميتر لقياس حركات الثني والمد (مرونة المفصل) ملحق (1) .
- 6- جهاز الداينوميتر لقياس قوة القبضة ملحق (1) .
- 7- جهاز ليزر نوع Beam 904 الماني الصنع عدد 2 ملحق (1) .
- 8- جهاز EK3-200 الجيل الثالث لقياس القوة العضلية امريكي الصنع من شركة Mark-10 ملحق (2).
- 9- سلسلة حديدية واحزمة عدد 10 وكاميرا نوع sony عدد 2.

5-2 أجرات البحث

1-5-2 الاختبارات المستخدمة

بعد اطلاع الباحث على العديد من المصادر العلمية الخاصة بإصابات مفصل المرفق واخذ رأي العديد من الخبراء في مجال التأهيل الرياضي والاختبارات والقياس تم تحديد الاختبارات الخاصة بالبحث وكما يلي :-

اولا: قياس قوة القبضة. (كاظم جابر أمير، 1999، ص336)

الهدف من القياس: قياس قوة القبضة لليد.

وحدة القياس:- كغم

الادوات المستخدمة:-جهاز داينومومتر .

تعليمات الاداء:- يمسك اللاعب المصاب بجهاز الداينومومتر بقبضته اليمنى (الذراع المصابة) وتكون الذراع ممدودة دون وجود اي انثناء في المفصل وتبتعد قليلاً عن الجسم.

حساب الدرجات:- يضغط اللاعب المصاب بقبضة اليد على الجهاز لمحاولة اخراج اقصى قوة ممكنة ويعطى لكل لاعب محاولتان تسجل افضلها.

ثانياً: قياس القوة العضلية للمجاميع العضلية للمرفق : (أحمد محمد خاطر، علي فهمي البيك،

1996، ص257)

تم قياس جميع المجاميع العضلية بنفس الطريقة التي استخدمها كلاً من (احمد محمد خاطر، علي فهمي البيك).

● **قياس قوة العضلات العاملة على ثني ومد الساعد.**

الهدف من القياس:- قياس قوة العضلات العاملة على ثني ومد الساعد.

وحدة القياس :- النيوتن

الأدوات المستخدمة :- جهاز EK3-200، سلاسل حديدية، بار خشبي مدرج، أحزمة .

تعليمات الأداء :- وقوف الظهر ملاصق للحائط ويثبت جسم اللاعب بواسطة الأحزمة في مناطق (الكتفين، الجذع-الحوض، القدمين)، بالإضافة الى ذلك فإن عضد الذراع الذي يجري عليه القياس

يثبت بحزام لين بالقرب من مفصل المرفق، والأصابع تكون مثنية (قبضة اليد مغلقة) وتتمر من خلال الحزام الدائري الذي سوف يثبت عليه طرف الساعد، وعند قياس قوة العضلات العاملة

على الثني فإن الجهاز يكون موجود اسفل الساعد. والعكس عند قياس العضلات العاملة على بسط مفصل يكون الجهاز أعلى الساعد، كما في الشكل، وعندما يكون الجهاز للأعلى يتم السحب للأسفل

من قبل المصاب، اما عندما يكون الجهاز للأسفل يتم رفع الذراع للأعلى

حساب الدرجات:- يعطى للمختبر محاولتان تسجل افضلها.

● **قياس قوة السحب للذراع :**

الهدف من القياس: - قياس قوة السحب للذراع.

وحدة القياس:- نيوتن.

الأدوات المستخدمة:- جهاز Ek3-200 ، سلسلة حديدية يثبت فيها الجهاز، بار خشبي مدرج

تثبت فيه السلسلة المربوط فيها الجهاز.

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

طريقة الاداء:- يقف المختبر امام البار الخشبي المثبت فيه الجهاز وتكون القدمان ثابتة في الارض، يقوم المختبر بسحب مقبض الجهاز باليد المصابة (اليمنى) الى اقصى قوة ممكنة، كما في الشكل.

التسجيل:- يعطى للمختبر محاولتان ويسجل افضلها.

• قياس قوة الدفع للذراع :

الهدف من القياس: - قياس قوة الدفع للذراع.

وحدة القياس:- نيوتن.

الادوات المستخدمة:- جهاز Ek3-200 ، المجس الخاص بالدفع لأستشعار القوة.

طريقة الاداء:- يقف المختبر امام الحائط ويمسك بمقبض الجهاز باليد اليمنى (المصابة) وتكون القدمان ثابتة في الارض ويقوم بالدفع بأقصى قوة ممكنة، كما في الشكل.

التسجيل:- يعطى للمختبر محاولتان تسجل افضلهما.



• قياس حركات الثني والمد Flexion- Extension . لمفصل المرفق.

(حسن سعد الله الجيجلي ، 2006 ، ص70)

الهدف من القياس :- قياس حركة الثني والمد لمفصل المرفق.

وحدة القياس:- الدرجة.

الأدوات المستخدمة :- جهاز الجانوميتر.

تعليمات الأداء :- يجلس المصاب ويدي ذراعه بجانب جذعه والساعد في وضعية الاستلقاء أو يستلقي المصاب على الظهر وتكون راحة كفه متجه للأعلى، كما في الشكل.

- نقطة المحور توضع على اللقيمة الوحشية لعظم العضد.

- الذراع الثابتة توضع موازية للخط المتوسط للجانب الوحشي للعضد.

- الذراع المتحركة توضع موازية للخط المتوسط للجانب الكعبري الوحشي وبتجاه النتوء الايري لعظم الكعبرة.

حركة المد (البسط) هي حركة العودة من الثني (العطف) ويكون وضع المصاب ومكان الجهاز كما في قياس الثني (العطف).

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

تسجيل الدرجات:- تسجل اقصى درجة يصل اليها المختبر.



2-5-2 الاجهزة المستخدمة



جهاز مارسي الوتد



جهاز الجانوميتير



جهاز الذايتوميتير



جهاز الليزر

• مواصفات جهاز الليزر

يتكون جهاز الليزر المستعمل في جلسات العلاج مما يأتي:-

1- اسم الجهاز:- Beam 904

2- مصدر الليزر:- ليزر زرنبيخ الغاليوم GaAs .

2- الطول الموجي:- 904 nm .

3- الطاقة:- 10 mw .

4- التنصيف:- 3B.

5- نوع الشعاع:- نابض



جهاز EK3-200 الالكتروني
لقياس القوة العضلية

مواصفات جهاز EK3-200:-

- 1- يقيس القوة العضلية بالاستشعار اثناء توتر العضلة واسترخائها.
- 2- يقيس قوة السحب وقوة الدفع للذراع الواحدة وللذراعين.
- 3- يقيس قوة الاوتار في الجسم.
- 4- يقيس قوة كل عضلة منفردة و يقيس المجاميع العضلية اثناء التوتر والاسترخاء.
- 5- يحمل شهادة عالمية.
- 6- يقيس القوة العضلية بالنيوتن والكيلو غرام والغرام والرطل.
- 7- يقوم الجهاز بخرن المعلومات داخل الجهاز ويتم نقل المعلومات من الجهاز الى الكمبيوتر عن طريق برنامج خاص بالجهاز.

3-5-2 التجارب الاستطلاعية :

أجرى الباحث تجربتين استطلاعيتين الاولى في يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 الساعة (9) صباحاً على أجهزة القياس، وكانت عينة التجربة مكونة من (5) مصابات من خارج عينة البحث. كما أجرى الباحث التجربة الاستطلاعية الثانية على نفس عينة التجربة الاستطلاعية الأولى بتاريخ 2017/4/6 الموافق يوم الخميس على جلسات الليزر ومفردات تمرينات القوة والمرونة باستخدام جهاز مارسي الوند. واجريت التجارب الاستطلاعية في قاعة مركز التأهيل الطبي وأمراض المفاصل/ في وزارة الصحة ، وكان الغرض من التجارب الاستطلاعية هو التأكد من ملاءمة القياسات ومفردات التجربة للعينة وتحديد الوقت اللازم لأجراء الاختبارات والتجربة الرئيسية، كذلك التغلب على جميع الصعوبات التي قد تواجه الباحث عند اجراء التجربة الرئيسية وتهيئة فريق العمل المساعد وتعريفهم على الية العمل.

2-5-4 المعاملات العلمية للاختبارات :

اولاً: الصدق:- يعد الصدق شرط من شروط تحديد صلاحية الاختبار وهو أهم المعاملات لأي مقياس أو اختبار ويعني الصدق "درجة الصحة التي نقيس بها الاختبار ما نريد قياسه".

(مروان عبد المجيد إبراهيم، 1999، ص13)

ثانياً: الثبات:- تعتمد صحة المقياس على مدى ثبات نتائجه وبدونه لا يكون هناك أي ثقة في تلك النتائج فالمقياس الثابت أو جهاز القياس الثابت سوف "يعطي نفس النتيجة لنفس الشخص عند إجراء القياس لمرات عديدة في نفس اليوم أو في أيام مختلفة حيث تكون النتيجة مؤشراً جيداً لقدرات هذا الشخص".

(ليلي السيد فرحات، 2007، ص143)

ثالثاً: الموضوعية :- تعد الموضوعية من العوامل المؤثرة في ثبات الاختبار وتعني "عدم تأثر نتائج القياس بالعوامل الذاتية والشخصية وتقدير القياس بوحدات ومعايير معروفة ومحددة لها سمة الثبات مثل السنتمتر للأطوال والكيلوغرام للأوزان وهكذا" (مسعد علي محمود، عمرو بدران ، 2004، ص317)

ان القياسات المستخدمة في البحث تم اجراءها بأجهزة وادوات دقيقة وثابت صدقها وثباتها بدرجة تامة وبذلك تعد القياسات ذات موضوعية عالية.

2-6 اجراءات التجربة :

2-6-1 القياسات القبلية :

تم اجراء القياسات القبلية لعينة البحث في قاعة العلاج الطبيعي في مركز التأهيل الطبي واصابات المفاصل بتاريخ 11-13/4/2023 الموافق الايام (الثلاثاء- الاربعاء- الخميس) في تمام الساعة (9) صباحاً، وقد عمد الباحثان على تثبيت الظروف كافة من أجل العمل على توافرها قدر المستطاع في القياسات البعدية من حيث الزمان والمكان والأجهزة والأدوات وطريقة التنفيذ والفريق المساعد.

2-6-2 التجربة الرئيسية (تمارين القوة والمرونة المصاحبة لجلسات العلاج بالليزر)

قام الباحث بأعداد برنامج تاهيلي يحتوي على تمارين القوة والمرونة باستخدام جهاز مارسي الوند التي تتبع جلسات العلاج بالليزر كذلك اعداد جلسات الليزر وتحديد عدد النقاط والوقت الذي يتم تسليطه على كل نقطة من النقاط، وقد تم عرض التمارين و جلسات الليزر المعدة على مجموعة من الخبراء والمختصين (ملحق 3) . وبعد الحصول على موافقتهم تم تطبيق التجربة الرئيسية. وقد راعى الباحث ان تكون التمارين المعدة جديدة وبأستعمال جهاز لم يستعمل من قبل في بحوث التربية الرياضية ويؤدي الى تحسين القوة والمرونة لمفصل المرفق المصاب. كما تم

مراعاة مبدأ التدرج في إعطاء التمرينات إذ تم زيادة التكرارات بشكل تدريجي، وتكون التمرينات ثابتة العدد وتطبق يومياً وبتكرارات تزداد كل يومين تكرار واحد، إذ بدأت التمرينات بعدد (4) من التكرارات وانتهت بـ (8) تكرار لكل تمرين، كذلك تم زيادة مقاومات الجهاز كل يومين مع التكرارات الى ان تصل الى اقصى مقاومة في اليومين الاخيرين، كما تم اعطاء راحة بينية بين التكرارات بقدر المدة التي إستغرقتها أداء التمرين (1:1). كذلك تم اعطاء راحة بينية بين تمرين وآخر. وكانت التمرينات العلاجية متنوعة واحتوت على الثبات في الوضع بوجود التكرار والزمن، وروعي تأدية التمرينات بإيقاع بطيء إذ تأخذ العضلات مدياتها الكاملة في أثناء عملها، وأستمرت التجربة 10 أيام . إذ بدأ العلاج بالليزر والتمرينات بتاريخ 2023/4/20 الموافق يوم الخميس وأنتهى بتاريخ 2023/4/29 الموافق يوم السبت.

2-6-3 القياسات البعدية :

بعد الإنتهاء من تطبيق التجربة الرئيسية قام الباحث بإجراء القياسات البعدية بتاريخ 1-2023/5/3 الموافق الايام (الاثنين- الثلاثاء- الاربعاء) في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مع مراعاة تثبيت الظروف نفسها التي أجريت فيها القياسات القبلية.

2-7 الوسائل الاحصائية المستعملة في البحث :

تم استخدام الحقيبة الاحصائية SPSS . لأيجاد كلاً من الوسيط والوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الالتواء وقيمة T-test للعينات المترابطة.

3- عرض وتحليل ومناقشة نتائج القياسات القبليّة والبعدية لعينة البحث
1-3 عرض وتحليل ومناقشة نتائج القياسات القبليّة والبعدية لمتغيرات القوة العضلية

جدول (2)

يبين دلالة الفروق بين القياسات القبليّة والبعدية في متغيرات القوة

الدلالة الإحصائية	Sig	قيم T-Test المحسوبة	الاختبار البعدي		الاختبار القبلي		المتغيرات	ت
			الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي		
دال	0,00	33,188	2,11	39,55	1,73	19,55	قوة القبضة	1
دال	0,00	62,627	4,01	73,50	3,11	52,25	قوة العضلات العاملة على ثني الساعد	2
دال	0,00	38,528	3,43	71,75	1,12	46,75	قوة العضلات العاملة على مد الساعد	3
دال	0,00	34,277	4,13	108,60	1,67	79,60	قوة الدفع للذراع	4
دال	0,00	20,926	8,06	115,25	6,09	93,25	قوة السحب للذراع	5

يتبين لنا من الجدول (2) أن الوسط الحسابي في الاختبار القبلي لمتغير قوة القبضة بلغ (19,55) وبأنحراف معياري (1,73)، أما الوسط الحسابي في الاختبار البعدي فقد بلغ (39,55) وبأنحراف معياري (2,11). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (33,188) بأحتمالية خطأ (0,00) وهو أقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبليّة والبعدية ولصالح القياسات البعدية.

كما أن الوسط الحسابي في الاختبار القبلي لمتغير قوة العضلات العاملة على ثني الساعد بلغ (52,25) وبأنحراف معياري (3,11)، أما الوسط الحسابي في الاختبار البعدي فقد بلغ (73,50) وبأنحراف معياري (4,01). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (62,627) بأحتمالية خطأ

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

(0,00) وهو اقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة أحصائية بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعدية.

كما أن الوسط الحسابي في الأختبار القبلي لمتغير قوة العضلات العاملة على مد الساعد بلغ (46,75) وبأنحراف معياري (1,12)، أما الوسط الحسابي في الأختبار البعدي فقد بلغ (71,75) وبأنحراف معياري (3,43). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (38,528) بأحتمالية خطأ (0,00) وهو اقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة أحصائية بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعدية.

أما الوسط الحسابي في الأختبار القبلي لمتغير قوة الدفع للذراع بلغ (79,60) وبأنحراف معياري (1,67)، أما الوسط الحسابي في الأختبار البعدي فقد بلغ (108,60) وبأنحراف معياري (4,13). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (34,277) بأحتمالية خطأ (0,00) وهو اقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة أحصائية بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعدية.

أما الوسط الحسابي في الأختبار القبلي لمتغير قوة الدفع للذراع بلغ (93,25) وبأنحراف معياري (6,09)، أما الوسط الحسابي في الأختبار البعدي فقد بلغ (115,25) وبأنحراف معياري (8,06). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (20,926) بأحتمالية خطأ (0,00) وهو اقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة أحصائية بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعدية.

من خلال عرض وتحليل نتائج القياسات القبلية والبعدية والتي بينها الجداول (2) ظهرت لنا بأن هناك فروقاً معنوية في متغيرات القوة العضلية (قوة القبضة، قوة العضلات العاملة على ثني ومد العضد وقوة الدفع والسحب للذراع) بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح البعدية ويعزو الباحثان سبب هذه الفروق في النتائج الى ممارسة العينة للتمارين المعدة بإستعمال جهاز مارسي الوند متعدد المقاومات والتي تلقته عينة البحث بصورة منتظمة إذ يحتوي الجهاز على خمس مقاومات تم التحويل بينها من الأدنى الى الأعلى بشكل متدرج كل يومين مع زيادة عدد التكرارات، كما تم تغيير الزوايا اثناء اداء التمرينات بالجهاز مما يؤدي الى تطوير القوة وهذا ما اكده (هزاع الهزاع 2009) من أن "القوة العضلية تتطور بشكل جيد عند الزاوية التي يتم فيها التمرين وبهذا يجب تكرار الانقباض عند زوايا عديدة لتطوير القوة العضلية على كامل المدى الحركي لذلك المفصل".

(هزاع بن محمد الهزاع.، 2009، ص10)

كما أن التزام العينة بجلسات الليزر والتمارين المعدة قد أدت الى تأثيرات إيجابية. ويرى الباحث أن استعمال الاجهزة الحديثة تعطي نتائج افضل وهذا ما أكد عليه (أسامة رياض وامام حسن

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

1999) من انه "عند استخدام الطرائق التقليدية للمقاومة كالاتقال لتقوية احدى المجموعات العضلية فأن ذلك قد يؤدي الى زيادة قوة بعض الالياف العضلية عن الاخرى إذ ان الثقل يكون ثابتاً ولكن يجب تغيير زاوية المفصل في اثناء الحركة فهذا يؤدي الى زيادة قوة العضلات المستخدمة، لذلك ينصح باستخدام الاجهزة الحديثة".

(اسامة رياض، امام حسن، 1999، ص117)

3-2 عرض وتحليل ومناقشة نتائج القياسات القبلية والبعديّة في متغيرات (الثني والمد) لمفصل المرفق.

جدول (3)

يبين دلالة الفروق بين القياسات القبلية والبعديّة في حركتي الثني والمد لمفصل المرفق

الدلالة الإحصائية	Sig	قيمة T-Test المحسوبة	الاختبار البعدي		الاختبار القبلي		المتغيرات	ت
			الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي		
دال	0,00	34,711	0,89	19,30	2,48	43,40	الثني	1
دال	0,00	45,891	0,68	147,90	3,38	117,10	المد	2

يتبين لنا من الجدول (3) أن الوسط الحسابي في الأختبار القبلي لمتغير حركة الثني بلغ (43,40) وبأنحراف معياري (2,48)، أما الوسط الحسابي في الأختبار البعدي فقد بلغ (19,30) وبأنحراف معياري (0,89). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (34,711) بأحتمالية خطأ (0,00) وهو اقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والبعديّة ولصالح القياسات البعديّة. كما أن الوسط الحسابي في الأختبار القبلي لمتغير حركة المد بلغ (117,10) وبأنحراف معياري (3,38)، أما الوسط الحسابي في الأختبار البعدي فقد بلغ (147,90) وبأنحراف معياري (0,68). أما قيمة (T-Test) المحسوبة فقد بلغت (45,891) بأحتمالية خطأ (0,00) وهو اقل من مستوى الدلالة البالغ (0,05) وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والبعديّة ولصالح القياسات البعديّة. من خلال عرض وتحليل نتائج القياسات القبلية والبعديّة لمتغيرات الثني والمد والتي بينها الجدول (3) ظهرت بأن هناك فروقاً معنوية بين القياسات القبلية والبعديّة ولصالح البعديّة، ويعزو الباحثان سبب هذه الفروق في حركات الثني والمد الى ممارسة العينة التمرينات المعدة بجهاز مارسي الوند

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

(متعدد المقاومات)، من خلال تغيير زوايا المفصل لكل تمرين من التمرينات المعدة، أي أن استعمال هذا الجهاز يتم من خلال تأدية التمرينات في زوايا واتجاهات مختلفة وفي نفس الوقت يولد مقاومة مناسبة مع القوة التي يظهرها الفرد مما يؤدي إلى زيادة القوة العضلية والمرونة في نفس الوقت وذلك من خلال إطالة العضلات العاملة ومطاطيتها وتأثيرها الإيجابي على تحسين أداء حركات الثني والمد لمفصل المرفق، وهذا يتفق مع ما أشار إليه (محمد حسن علاوي، 1972) "إلى إن تمرينات إطالة العضلات والأربطة والأوتار وزيادة مدى الحركة في المفصل من أهم الوسائل لتنمية المرونة".

(محمد حسن علاوي ، 1972 ، ص50)

كما أن زيادة التكرارات للتمرين الواحد أدى إلى تحسن مرونة مفصل المرفق وهذا ما أكده (قاسم حسن حسين 1998) من أن "زيادة عدد مرات تكرار التمرين يؤدي إلى تطوير المرونة وأن عدم كفاية مرونة المفاصل يؤدي إلى ضعف قابلية القوة العضلية".

(قاسم حسن حسين ، 1998 ، ص280)

4- الاستنتاجات والتوصيات :

1-4 الاستنتاجات :

- 1- أن للعلاج بالليزر تأثير إيجابي وسريع في تخفيف الألم وسرعة شفاء الأصابة.
- 2- أن البرنامج التأهيلي باستخدام تمرينات القوة والمرونة وجهاز مارسي الوتد أدى إلى زيادة القوة والمرونة لمفصل المرفق.
- 3- أن أداء التمرينات بتكرارات تتناسب ومقدرة العينة أدى إلى نتائج إيجابية.
- 4- أن استخدام الأجهزة الحديثة سواء في العلاج أو في التمرينات والقياسات تؤدي إلى اختصار الوقت والجهد.

2-4 التوصيات :

- 1- اعتماد جلسات العلاج بالليزر في علاج مختلف الإصابات لكونه يحقق نتائج جيدة وبوقت قصير.
- 2- استخدام الأجهزة الحديثة في أداء التمرينات لأنها توفر الوقت والجهد.
- 3- استخدام أجهزة القياس الحديثة والتي تعطي نتائج دقيقة.
- 4- إجراء بحوث ودراسات لأصابات أخرى حول العلاج بالليزر وجهاز مارسي الوتد.

المصادر

- اسامة رياض، امام حسن: الطب الرياضي والعلاج الطبيعي، الطب الرياضي والعلاج الطبيعي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، القاهرة، 1999.
- أحمد محمد خاطر، علي فهمي البيك: القياس في المجال الرياضي. القاهرة، ط4، دار الكتاب الحديث، 1996.
- حسن سعد الله الجيجكلي. التمرينات العلاجية واساليب التقييم الفيزيائي، ط1، شعاع للنشر والعلوم، سوريا، 2006.
- قاسم حسن حسين. علم التدريب الرياضي في الاعمار المختلفة، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 1998.
- كاظم جابر أمير. الاختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي، ط2، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1999.
- ليلي السيد فرحات. الاختبار والقياس في التربية الرياضية، ط4، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2007.
- محمد حسن علاوي. علم التدريب الرياضي، ط3، دار المعارف، القاهرة، 1972.
- مروان عبد المجيد إبراهيم. الأسس العلمية والطرائق الإحصائية للاختبارات والقياس في التربية الرياضية، ط1، دار الفكر للطباعة والتوزيع، عمان، 1999.
- مسعد علي محمود، عمرو بدران: مدخل التربية البدنية والرياضية، ط3، دار الاسلام للطباعة والنشر، المنصورة، 2004.
- هزاع بن محمد الهزاع. فسيولوجيا الجهد البدني (الأسس النظرية والأجراءات المعملية للقياسات الفسيولوجية) السعودية، 2009.
- Herman.J.M:and Khosla,R,Na,YAG laser modulation of synovial tissue,metabotism.clim.Exp ,Rheumatol 2007

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

ملحق (1)


جلسات العلاج بالليزر لإصابة المرفق

الزمن الكلي للجلسة	الزمن لكل نقطة	الكثافة الكلية للجلسة	الكثافة لكل نقطة	الشدة	التردد	الرسم التوضيحي لنقاط العمل (منطقة المعالجة)
min 16	min 4	J 1.472	mJ368	10 mw	HZ 640	 عدد النقاط 4

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...


شرح التمرين	صورة التمرين	رقم التمرين
<p>(الوقوف- فتحاً - الذراع للجانب) ، وضع الذراع المصاب داخل الجهاز بحيث يكون معصم اليد داخل قبضة الجهاز وتكون قبضة اليد للأسفل ومعيار الجهاز على مقاومة رقم 1، سحب الجهاز بقبضة اليد للأسفل 6 مرات ثم السحب والثبات بالوضع (6ثا). وهذا يعد تكرار واحد)</p>		1
<p>(الوقوف- فتحاً - الذراع للجانب)، وضع الذراع داخل الجهاز بحيث يكون معصم اليد داخل قبضة الجهاز وتكون قبضة اليد للأعلى ومعيار الجهاز على مقاومة رقم 1، سحب الجهاز بقبضة اليد للأعلى 6 مرات ثم السحب والثبات بالوضع (6ثا). (وهذا يعد تكرار واحد)</p>		2
<p>(الوقوف- فتحاً- الذراع للجانب بمستوى الجسم)، وضع الذراع داخل الجهاز بحيث يكون معصم اليد داخل قبضة الجهاز وتكون قبضة اليد مواجهه للجسم، ومعيار الجهاز على مقاومة رقم 1، سحب الجهاز بقبضة اليد للداخل 6 مرات ثم السحب والثبات بالوضع (6ثا). (وهذا يعد تكرار واحد)</p>		3

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...

<p>(الوقوف- فتحاً- الذراع للجانب بمستوى الجسم) ، وضع الذراع داخل الجهاز بحيث يكون معصم اليد داخل قبضة الجهاز وتكون قبضة اليد بالاتجاه الخارجي للجسم ومعيار الجهاز على مقاومة رقم 1 ، سحب الجهاز بقبضة اليد للخارج 6 مرات ثم السحب والثبات بالوضع (6ثا). (وهذا يعد تكرار واحد)</p>		<p>4</p>
---	---	----------

<p>(الوقوف- فتحاً- الذراع للأمام) ويشكل زاوية قائمة بين الساعد والعضد، وضع الذراع داخل الجهاز بحيث يكون معصم اليد داخل قبضة الجهاز وتكون قبضة اليد مقابلة للجسم ومعيار الجهاز على مقاومة رقم 1 ، سحب الجهاز بقبضة اليد للداخل 6 مرات ثم السحب والثبات بالوضع (6ثا). (وهذا يعد تكرار واحد) (العضد افقي والساعد عمودي)</p>		<p>5</p>
<p>(الوقوف- فتحاً - الذراع للأمام) ويشكل زاوية منفرجة بين الساعد والعضد، وضع الذراع داخل الجهاز بحيث يكون معصم اليد داخل قبضة الجهاز وتكون قبضة اليد مقابلة للجسم ومعيار الجهاز على مقاومة رقم 1 ، سحب الجهاز بقبضة اليد للداخل 6 مرات ثم السحب والثبات بالوضع (6ثا). (وهذا يعد تكرار واحد)</p>		<p>6</p>

The effect of a therapeutic program using the Marcy wedge device ...



اليوم الاول والثاني(مقاومة 1) للتمرينات المعدة باستخدام جهاز مارسي الوتد

رقم التمرين	زمن اداء التمرين الواحد	التكرار	الراحة بين التكرارات	الراحة بين التمرينات	الزمن الكلي
1	18 ثا	4	18 ثا	45 ثانية	2187 ثانية
2	18 ثا	4	18 ثا		
3	18 ثا	4	18 ثا		
4	18 ثا	4	18 ثا		
5	18 ثا	4	18 ثا		
6	18 ثا	4	18 ثا		
					36.45 دقيقة